

Genstande og alkoholproblemer Grønland

Nuuk
Dag 1; oktober 2022
Ulrik Becker
Professor, dr.med
Statens Institut for Folkesundhed, SDU

ulbe@si-folkesundhed.dk

tlf. +45 23 39 17 28

1 Qallunaatut imigassaq ataasinnguaq = 12 g alkohol

- 1 almindelig øl = 1 genstand
- 1 hvidtøl = 0,4 genstand
- 1 lys pilsner = 0,6 genstand
- 1 eksport-øl = 1,3 genstande
- 1 porter = 1,7 genstande
- 1 flaske vin = 6 (8) genstande
- 1 flaske portvin = 10 genstande
- 1 flaske whisky = 20 genstande

Atuingaatiarneq

- ??????????????
- **Isumaqtigiinnginnermi**
 - > Peqqissutsimut aqtsisoqarfiup annerpaffiliinera malillugu (14/21 ataasinnguit/sapaatip akunneranut)
 - Naviananngitsoq
 - pinngitsuuvisinnaajunnaarnikuungitsoq

3

Atuineq navianartoq ICD-10

- **Timikkut tarnikkulllu ajoquusernerit
(pissusermik naliliisinnaanermillu
ajoquusersimaneq ilaatillugu)**
- **Ajoquusersimanerup erseqqarinnera**
- **Sivisussuseq qaammammi ataatsimi imalt.
Ukiup ataatsip ingerlanerani arlaleriarluni**
- **pinngitsuuvisinnaajunnaarnikuungitsoq
(pinngitsuuvisinnaajunnaarsimasunngorsima
nngitsoq)**

4


**ikinnerpaanik 3-6-riarluni ersiuteqarneq imalt. qaammatit 12-t
ingerlanerini arlaleriarluni**

- Ajorsarneq (perusunneq)
- Imernermi aqutsisinnaanermik, unitsitsisinnaanermik imalt. annikilliliinissamut piginnaassusermik sangiilliisimaneq
- Atuiunnaarnermi imalt. imerunnaarnermi kingunerlutsitsinermi ersiutit pinngitsoorniarlugit
- Akuersaarnermik ineriaartortitsineq
- Tulleriaarinermi piffissamillu atuinermi salliuutsineq
- Atuineq ingerlatiinnarneqartoq nalunngikkaluarlugu..

**3 af 6 symptomer sammenhængende i mindst én måned eller
gentagne gange indenfor de seneste 12 måneder**

- Trang til stoffet ("craving")
- Svækket evne til at kontrollere indtagelsen, standse eller nedsætte forbruget
- Abstinenssymptomer ved ophør/reduktion eller indtagelse for at undgå symptomer
- Toleransudvikling
- Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug
- Fortsat forbrug mod bedre vidende

- **Storforbrug**
 - > genstandsgrænser
- **Skadeligt forbrug**
 - ICD-10/DSM-IV (misbrug)
- **Afhængighed**
 - ICD-10/DSM-IV



Stigende sværhedsgrad

Atuineq navianartoq/
pinngitsuuisinnaajunnaarsimanaerup
isumasiornera

- Nassuaat "atugaq"-mut apeqqutaatinnagu
- Amerlassusermut tunnganngilaq !
- Inuunerup sinneranut nappaataangilaq !
- Siunissami
 - nappaat ataaseq
 - "naliliineq"

Allorfiks måde at forstå rusmiddelproblemer på

Som en tillært adfærd, der har
sammenhæng med arvelige, sociale
og sygdomsmæssige forhold



Hvornår har man et alkoholproblem ?

- Når man drikker mere end Sundhedsstyrelsen
anbefaler?
- Når man har fået skrumpelever?
- Når man har fået snuppet kørekortet?
- Når man drikker mere end sin læge?
- Når nogen bliver kede af det?
 - Ægtefælle
 - Arbejdskamerater
 - Børnene