



1

Der eksisterer et alkoholproblem i familien, når:

- Brugen af alkohol virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien
- De følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes og forstyrres af en andens brug af alkohol

Frid Hansen

SDU 

2

Når en forælder drikker

SDU 

3

Børn i familier med rusmidler

SDU 

4

Spørgsmål:


Hvordan påvirker alkohol en familie? Hvordan reagerer børnene:
Under graviditeten og de første leveår?

Småbørn?

Små skolebørn?

Teenagere?

Familiens forskellige fokus på et rusmiddelproblem



For de pårørende er uforudsigeligheden det mest uudholdelige.
Derfor kan de gode perioder være de mest pinefulde – hvor længe varer det?

(Efter: Helene Bygholm Risager)

Forskellige kendetegn, der kan optræde i en familie med alkoholproblemer:

- Centrerung
- Rolleombytning
- Uforudsigelighed og bifasisk fungeren
- Skyld og skam
- Isolation
- Konflikter / vold / omsorgssvigt / overgreb
- Benægtelse / kognitive forvrængninger / selektiv perception



7

Risikostatus og symptomer

- Barnets belastningsgrad er tæt relateret til forældrenes oplevelse af egne symptomer på psykiske belastninger
- Socialklasse er uden betydning for barnets risikostatus
- Forskellige typer symptomer hos barnet afhængig af barnets køn, den drikkende forældres køn, socialklasse, drikkemønster mv

Kilde: Helene Bygholm Risager: Børnefamilier med alkoholproblemer, 2000



8

Når børn i alkoholfamilier bliver voksne...

Ca. 1/3 udvikler alkohol- og stofproblemer

Ca. 1/3 udvikler psykiske vanskeligheder


40% af personer i alkoholbehandling er selv vokset op i familier med alkoholproblemer

Kilde: Helene Bygholm Risager: Børnefamilier med alkoholproblemer, 2000
AS Nielsen, B Nielsen, P Petersen. Behandlingsbehov hos alkoholmisbrugere, hvis forældre havde et alkoholmisbrug, ugeskr Læger, 2000;162/34:4550-44



9

NB: Udvid dette med mere fra rapporten




Mental sundhed og helbred blandt 15-34-årige i Grønland




10

Karakteristisk af de fire opvækstgrupper		Opvokset i by, lav belastning	Opvokset i bygd, moderat belastning	Høj belastning, høj kulturel tilknytning	Høj belastning, lav kulturel tilknytning	TOTAL
Befolkningsundersøgelsen 2018						
Total [N (% af hele populationen)]		287 (50,7)	80 (14,2)	76 (13,5)	122 (21,6)	565 (100)
KØN [N (%)]	Kvinder	122 (42,5)	42 (52,5)	48 (62,3)	67 (54,9)	
	Mænd	165 (57,5)	38 (47,5)	28 (37,7)	55 (45,1)	
TOTAL		287 (100)	80 (100)	76 (100)	122 (100)	
ALDER [N (%)]	15-19 år	72 (25,2)	22 (27,5)	11 (14,3)	19 (15,6)	
	20-24 år	81 (28,3)	16 (20,0)	22 (28,6)	26 (21,3)	
	25-29 år	65 (22,7)	19 (23,8)	25 (32,5)	48 (39,3)	
	30-34 år	69 (23,8)	23 (28,7)	18 (23,7)	29 (23,6)	
TOTAL		287 (100)	80 (100)	76 (100)	122 (100)	
NUVÆRENDE BOPÆL [N (%)]	Nauk	110 (38,5)	13 (16,3)	10 (13,0)	34 (28,1)	
	By	173 (60,5)	32 (40,0)	59 (76,6)	73 (60,3)	
	Bygd	5	25 (45,8)	6 (10,4)	14 (11,6)	
TOTAL		287 (100)	80 (100)	76 (100)	122 (100)	
NUVÆRENDE REGION [N (%)]	Sydvestgrønland	38 (13,3)	15 (18,5)	15 (19,7)	21 (17,2)	
	Centrale Vestgrønland	179 (62,6)	20 (24,7)	19 (25,0)	58 (47,5)	
	Nordvestgrønland	63 (22,0)	40 (49,4)	32 (42,1)	31 (25,4)	
	Østgrønland	6 (2,1)	6 (7,4)	10 (13,2)	12 (9,8)	
TOTAL		287 (100)	80 (100)	76 (100)	122 (100)	
VELSTANDS- INDEKS [N (%)]	0-3 (lav velstand)	33 (11,5)	25 (31,3)	17 (22,1)	26 (21,5)	
	4	51 (17,9)	24 (30,0)	22 (28,6)	32 (26,4)	
	5	106 (37,3)	22 (27,5)	25 (32,5)	40 (33,1)	
	6 (høj velstand)	96 (33,6)	9 (11,3)	13 (16,9)	23 (19,0)	
TOTAL		287 (100)	80 (100)	76 (100)	122 (100)	



Figur 3.5. Andel, der ofte føler sig ensomme i relation til opvækstgrupper og køn. Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018. Deltagere 15-34 år. N=564.



SDU

13

NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY
<https://doi.org/10.1080/08039488.2019.1696887>

Taylor & Francis
 Taylor & Francis Group

ARTICLE

Check for updates

Does establishing local treatment institutions lead to different populations seeking treatment among Greenlandic Inuit?

Julie Flyger^{a,b}, Bent Nielsen^{a,c}, Birgit V. Niclasen^b and Anette Søgaard Nielsen^{a,c}

^aUnit of Clinical Alcohol Research (UCAR), Institute of Clinical Research, University of Southern Denmark, Odense, Denmark;

^bAllorfik, National Addiction Treatment Service, Nuuk, Greenland; ^cDepartment of Mental Health, Odense, Denmark

ABSTRACT

Introduction: In 2016, a new addiction treatment service was established in Greenland to tackle the addiction problems with alcohol, cannabis and gambling among the population. The new service has established a treatment center in each of the five municipalities and works in partnership with a central private provider of treatment for those who reside in areas without a local treatment center.

Methods: The national addiction database provided us with data from the Alcohol Use Disorder Identification Test, Alcohol Severity Index and questions on cannabis use and gambling behavior

ARTICLE HISTORY

Received 26 April 2019
 Revised 30 August 2019
 Accepted 17 November 2019

KEYWORDS

Local treatment; alcohol

SDU

14

14

Table 1. Population characteristics.

Population characteristics	Local (N = 189)	Central (N = 256)	p Value
Females % (N)	66.1 (125)	56.1 (143)	.020
Age, mean (SD)	37.78 (11.82)	36.91 (11.92)	.448
Cohabiting with partner ^a % (N)	55.2 (101)	55.8 (135)	.490
Children <18 years in home % (N)	53.4 (101)	38.7 (99)	.001
Highest achieved education ^b % (N)			
Primary school	91.9 (170)	87.7 (222)	.187
High school	0.5 (1)	2.4 (6)	.127
Higher education	7.6 (14)	9.9 (25)	.243
Employment ^c % (N)			
Employed	56.3 (103)	45.1 (114)	.013
Not employed	43.7 (80)	54.9 (139)	

^aMissing = 20.^bMissing = 7.^cMissing = 9.

Flyger et al, Nordic Journal of Psychiatry, 2019



15

15

Table 3. Upbringing characteristics.

Upbringing	Local (N = 189)	Central (N = 256)	p Value
Childhood living condition ^a % (N)			
Safe	48.3 (83)	37.0 (84)	.016
Instable or chaotic	51.7 (89)	63.0 (143)	
Alcohol abuse, parent ^b % (N)	88.3 (158)	92.6 (225)	.090
Alcohol abuse, grandparents ^c % (N)	72.0 (136)	64.8 (166)	.127
Alcohol abuse, siblings ^d % (N)	83.9 (146)	75.7 (181)	.028
Drug abuse, parent ^e % (N)	32.5 (50)	39.9 (79)	.093
Drug abuse, grandparents ^f % (N)	18.9 (14)	29.2 (19)	.110
Drug abuse, siblings ^g % (N)	63.0 (102)	55.4 (118)	.086

Flyger et al, Nordic Journal of Psychiatry, 2019



16

16

Negative barndomsoplevelser øger risikoen for senere afhængighed af alkohol

Table 3. Single childhood exposures and adjusted odds ratios (OR)^a of alcohol dependence

Exposures	Men		Women	
	OR	95% CI	OR	95% CI
Parental alcoholism	2.14	1.45–3.15	2.51	1.62–3.89
Childhood abuse				
Physical abuse	1.47	1.02–2.11	2.02	1.43–2.86
Physical neglect	1.54	1.06–2.25	1.64	1.16–2.32
Sexual abuse	1.46	0.98–2.18	2.40	1.68–3.43
Both physical and sexual	1.58	1.10–2.27	2.31	1.60–3.35
Emotional abuse	1.33	0.88–1.99	2.08	1.47–2.94
Emotional neglect	0.69	0.42–1.14	2.16	1.49–3.13
Out-of-home placement				
Boarding school attendance	1.44	0.92–2.25	1.79	1.19–2.70
Foster care placement	1.45	0.84–2.51	1.77	1.13–2.75

^aOR adjusted for age and tribal community. Due to small sample size, adoption not included in these analyses. CI, confidence interval.

Koss et al. Am J Prev Med 2003;25(3)

